

# Le VIH au Canada : jadis et aujourd'hui

	Passé	Présent
Nombre de cas déclarés de VIH	1985-1994 : 32 841	2009 : De 2 300 à 4 500 par année
Pourcentage d'hommes gais ou ayant des rapports sexuels avec des hommes, parmi les cas déclarés de VIH	1985-2001 : 64,2 %	2009 : 43,1 %
Pourcentage de personnes faisant usage de drogue par injection, parmi les cas déclarés de VIH	1985-2001 : 19,0 %	2009 : 22,7 %
Pourcentage de femmes, parmi les cas déclarés de VIH	Avant 1998 : 11,9 %	2007 : 24,9 %
Pourcentage de cas déclarés de VIH attribués à des rapports hétérosexuels	1985-2001 : 16,1 %	2009 : 35,3 %
Pourcentage de personnes autochtones, parmi les cas déclarés de VIH	1985-1997 : 15,0 %	2007 : 21,4 %
Pourcentage de personnes de race noire, parmi les cas déclarés de VIH	1985-1997 : 3,7 %	2007 : 10,3 %
Nombre de cas déclarés de sida	Pic atteint en 1993 : 1 827	2007 : 238
Médicaments et traitements	<b>Fin des années 80</b> : Avènement des premiers traitements (AZT et DDI); thérapie consistant généralement en un cocktail de médicaments antirétroviraux (ARV); effets indésirables souvent débilitants; peu d'avenues de rechange; seulement six ARV étaient disponibles.	<b>2008</b> : Avènement de traitements simplifiés à un comprimé par jour; les effets indésirables sont encore une réalité, mais moins marquées dans la plupart des cas; le VIH procède encore à des mutations rapides et acquiert une résistance à divers médicaments; quatre classes de médicaments contre le VIH existent à présent; environ 24 médicaments sont approuvés au Canada; 80 % des personnes qui ont la maladie à VIH en phase avancée suivent un traitement ARV.
Principaux enjeux	Efforts de sensibilisation et de prévention; mobilisation, organisation et développement de capacité au palier communautaire; initiatives surtout dans la communauté gaie, où s'observe le taux de prévalence le plus élevé.	<b>2009</b> : Criminalisation de la transmission du VIH; personnes âgées qui vivent avec le VIH; augmentation des cas de VIH dans la population hétérosexuelle; traitement antirétroviral comme moyen préventif; voir aux déterminants sociaux de la santé; sensibilisation et prévention sont encore cruciales; on reconnaît que le VIH affecte plusieurs groupes différents; bien que la connaissance du VIH se soit améliorée parmi le grand public, la stigmatisation et la discrimination s'observent encore.
Développement d'un vaccin	<b>1985</b> : Amorce de travaux pour développer un vaccin anti-VIH <b>1987</b> : premier essai clinique d'un vaccin anti-VIH <b>1997</b> : plus de 95 essais cliniques de vaccins anti-VIH ont eu lieu	<b>2009</b> : Approximativement 30 candidats de vaccins contre le VIH/sida sont présentement en essais cliniques chez des humains; approximativement 150 essais cliniques ont eu lieu, dont 4 ont été retirés, 3 ont été suspendus, et 4 ont été annulés.
Espérance de vie d'une personne séropositive au VIH	<b>1980s</b> : 1 - 2 ans après un diagnostic de sida.	<b>2009</b> : 13 ans de plus que la prédiction des années 1980.